




## AMSLER-GITTER-TEST



# Amsler-Gitter-Test

- Falls Sie eine Brille (Lesebrille) oder Kontaktlinsen tragen, benutzen Sie diese!
- Halten Sie das Amsler-Gitter auf Lesedistanz (ca. 30 cm)
- Halten Sie ein Auge zu
- Fixieren Sie den schwarzen Punkt in der Mitte
- Beurteilen Sie nun, wie die Linien rund um den schwarzen Punkt aussehen:
  - Sehen Sie verzerrte, verbogene oder verschwommene Linien?
  - Erscheinen Ihnen die Linien unterbrochen oder fehlen diese ganz?

## Wiederholen Sie den Test mit dem anderen Auge

**Wenn dies der Fall ist, suchen Sie sofort Ihren Augenarzt auf!**

### Ein kleiner Tipp:

Kleben Sie das Amsler-Gitter mit einem Klebe- streifen in Ihren Küchenschrank. Wenn Sie morgens Ihre Tasse herausholen, sehen Sie den Test und machen ihn automatisch.



Operative  
Augenarztpraxen  
Nizamaldin

Ostend Str. 67, 70188 Stuttgart  
+49 (0) 711 28 646 32  
info@stuttgart-augen.de

[www.stuttgart-augen.de](http://www.stuttgart-augen.de)